

# Identifique los criterios de calidad en tolva para racimos de fruto de palma de aceite en cultivares híbridos OxG

## CRITERIO POR ESTADO DE MADURACIÓN



**Inmaduro**

Sin cuarteamiento ni desprendimiento de fruto naturalmente.



**Maduro**

Desprendimiento desde 10 frutos hasta el 25 % en su capa externa. Pueden presentar o no cuarteamiento.



**Sobremaduro**

Desprendimiento natural de 25 % hasta el 50 % de los frutos en su capa externa. Deshidratación parcial del pedúnculo.



**Podrido y tusas vacías**

Deshidratación, pedúnculo blando y olor fétido. Desprendimiento de más del 50 % de fruto de forma natural y tusas vacías.

## CRITERIOS EXTERNOS



**Impurezas**

Piedras, espatas, materiales de cosecha, arena, etc.



**Pedúnculo largo**

Más de 3 cm por encima de la base del hombro del racimo.

## CRITERIO POR CONFORMACIÓN

Llenado de los racimos de acuerdo con el rango de formación de frutos normales y partenocárpicos.

### CLASE 4




Menos del 50 %

### CLASE 3



Entre el 50 y 70 %

### CLASE 2





Entre 70 y 90 %

### CLASE 1



Igual o mayor al 90 %

**ENTREGUE A LA PLANTA DE BENEFICIO ESTE TIPO DE RACIMOS**



**Y GÁNESE HASTA EL ÚLTIMO PESO**

Desarrollado por: Comité de Plantas de Beneficio Zona Suroccidental